

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。



メンソレータム®

メディクイック®N軟膏

鼻などのかゆみ・皮膚炎治療薬

メンソレータム®メディクイック®N軟膏

第2類医薬品

メンソレータム®メディクイック®N軟膏は  
鼻の穴入口やまわりのかゆみに効くお薬です。



管理コード  
512086A1

## こんなとき、鼻が痛がゆくてお困りの方に

乾燥



鼻のかみすぎ



摩擦・こすれ



## 4つの有効成分が痛がゆい炎症にアプローチ

素早くかゆみを抑える  
リドカイン

患部を殺菌  
イソプロピル  
メチルフェノール

かゆみ  
炎症


かゆみの原因となる  
炎症をおさえる  
プレドニゾロン吉草酸  
エステル酢酸エステル

血行を促進する  
ビタミンE誘導体

## 鼻の穴入口にも、鼻のまわりにも使える

### 鼻の入口に使用する場合

清潔にご使用いただくため、また鼻の中を傷つけないため綿球の下を持ってご使用ください。



※裏面<鼻の穴入口に  
使用する場合の注意>  
をよくお読みの上、ご  
使用ください。

鼻の入口に  
綿棒で塗る

### 鼻のまわりに使用する場合

患部にお薬をのせ、擦りこまことにやさしくのばしてください。



鼻のまわりに  
指で塗る

## ⚠ 使用上の注意

### ☒ してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないでください。
  - 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部
  - 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
- 顔面には、広範囲に使用しないでください。
- 長期連用しないでください。



### 相談すること

- 次の人には使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦または妊娠していると思われる人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 患部が広範囲の人
  - 湿潤やただれのひどい人

- 使用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ
皮フ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

■効能・効果　かゆみ、皮フ炎、湿疹、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ

■用法・用量　1日数回、適量を患部に塗布してください。

最初にご使用になるときは、キャップを逆さにしてチューブの口に強く押し込んで穴を開けてください。

<用法・用量に関する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみご使用ください。

<鼻の穴入口に使用する場合の注意>

○鼻毛の生えているところにのみ使用し、粘膜には使用しないでください。

○小児(15才未満)は使用しないでください。

○綿棒で鼻の中を傷つけないように注意してください。  
また、鼻の奥まで綿棒を入れないでください。

○綿棒使用の際は、綿球の下を持って、こすらずにやさしく塗布してください(右図)。

○化膿しているところには使用しないでください。

○長期連用しないでください。

○症状が治りにくい時、また、慢性的に症状をぶりかえす方は、医師に相談してください。



■成分・分量  
(1g中)

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(合成副腎皮質ホルモン) 1.5mg、  
リドカイン10mg、イソプロピルメチルフェノール1mg、トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体) 5mg  
添加物: ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、  
N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、流動パラフィン、  
ワセリン、パラフィン

■保管及び  
取扱い上の  
注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先: ロート製薬お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020  
大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00  
(土、日、祝日を除く)

[発 売 元] ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

[製造販売元] ジャパンメディック株式会社  
富山市横越168