

Vロート PREMIUM ロート史上最高峰*処方。 酷使して蓄積したつらい疲れ目を治す!

◆国内最多12有効成分配合

(基準*内)

現代人の疲れ目を科学し、その原因に多角的にアプローチ。

◆角膜保護成分高分子コンドロイチン配合

(コンドロイチン硫酸エステルナトリウム)

角膜を覆って保護し、疲れを改善します。

※ロート製薬の目薬として最多有効成分配合 *基準とは厚生労働省が承認事務の効率化を図るために定めた医薬品の範囲

どの角度からでもさしやすい

フリー
アングル
ノズル®

簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式
スクリュー
キャップ

開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意 ▲

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人: はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人: 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

用法・用量

1回1~2滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたりかえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることのないように

成 分

有効成分	配合量	はたらき
塩酸テトラヒドロゾリン	0.05%	血管を収縮させて目の充血を抑えます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能を回復して目の疲れを改善します。
アラントイン	0.1%	起こってしまった炎症症状(かゆみ・充血など)を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.1%	炎症の原因となる物質の放出を抑え、かゆみ・充血を抑えます。
硫酸亜鉛水和物	0.1%	紫外線などによる目の炎症を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	ヒスタミンをブロックして目のかゆみを抑えます。
ビタミンB6	0.05%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
パンテノール	0.1%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
酢酸d-α-トコフェロール	0.025%	血行を促進して目の疲れを改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	1%	細胞呼吸を促進して目の疲れを改善します。
タウリン	0.5%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.25%	角膜表面を保護して目の疲れを改善します。


添加物として、ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d&l-カンフル、ゲラニオール、ユーカリ油、エデト酸Na、塩化Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クロロブタノール、pH調節剤

効能・効果

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| ○目の疲れ | ○眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど) |
| ○結膜充血 | ○眼瞼炎(まぶたのただれ) |
| ○目のかすみ(目やにの多いときなど) | ○紫外線その他の光線による眼炎(雪目など) |
| ○目のかゆみ | ○ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感 |

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2)キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5)他の人と共用しないでください。
- (6)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (7)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとつてご使用ください。
- (8)容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)